

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

## Feuillet d'information destiné au patient Rituximab régulier

**Rédaction** : septembre 2003

**Révision** : mai 2016

MÉDICAMENT	HORAIRE D'ADMINISTRATION
Rituximab	En perfusion intraveineuse une fois par semaine sur quelques heures
<b><i>Répéter le traitement 1 fois par semaine pour 4 doses</i></b>	

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

## Généralités associées à votre traitement

- ❑ Le rituximab est utilisé pour empêcher la multiplication des cellules anormales et les détruire.
- ❑ Une **prise de sang** sera faite avant chaque cycle de traitement. La dose du médicament pourra être ajustée ou le traitement retardé si nécessaire selon le résultat et/ou selon les effets indésirables survenus lors du traitement précédent.
- ❑ De la **fatigue** peut survenir durant vos traitements. Ceci est habituellement temporaire et peut être relié à plusieurs facteurs (médication, stress, maladie,...). Gardez un bon niveau d'activité mais reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin.
- ❑ La consommation d'**alcool** (en petite quantité) est considérée sécuritaire et n'affectera pas l'efficacité du traitement.
- ❑ L'effet du médicament sur l'embryon n'est pas connu lorsqu'il est administré pendant la grossesse. La prise d'un moyen de **contraception** pendant le traitement est donc fortement recommandée. L'allaitement est contre-indiqué pendant toute la durée de la chimiothérapie.
- ❑ Une **vie sexuelle** active n'est pas interdite durant vos traitements. Cependant, une diminution du désir peut survenir de façon temporaire durant cette période. Cela peut être influencé par plusieurs facteurs : fatigue, stress, etc.
- ❑ Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments (même ceux ne nécessitant pas de prescription) ou des produits naturels. Certains pourraient provoquer une interaction avec votre traitement et en diminuer l'efficacité ou en augmenter les effets indésirables.
- ❑ Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et la disposition sécuritaires des liquides biologiques (p. ex. : urine, selles) pour protéger l'environnement et vos proches.
- ❑ Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de tous vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines, et autres produits de **santé naturels** et d'en remettre une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

## Effets indésirables et mesures à prendre

<b>EFFETS INDÉSIRABLES</b>	<b>MESURES A PRENDRE</b>
<p>Des <b>maux de cœur</b> habituellement légers peuvent survenir surtout le jour même et le lendemain de votre traitement.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Au besoin, avant votre traitement, des médicaments pour prévenir les maux de cœur pourraient vous être prescrits. A la maison, vous pourriez aussi avoir des médicaments à prendre au besoin pendant 1 à 2 journées ou plus, selon le cas.</li><li>• Communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des maux de cœur qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.</li></ul>
<p><b>Aucune perte de cheveux</b> ne se produit avec ce traitement.</p>	
<p>Une diminution des <b>globules blancs</b> est peu probable mais peut survenir suite au traitement. Vous pourriez être plus à risque de contracter des infections durant cette période.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavez-vous les mains souvent.</li><li>• Durant cette période, évitez d'entrer en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses.</li><li>• Signalez-nous rapidement tous signes d'infection (fièvre, frisson, toux, maux de gorge, douleur lorsque vous urinez,...)</li><li>• Consultez votre médecin ou présentez-vous immédiatement à l'urgence si vous faites de la fièvre 38,3°C (101°F) une fois ou 38°C (100.4°F) 2 fois à une heure d'intervalle.</li><li>• Évitez la prise d'acétaminophène (p. ex : Tyléno<sup>MD</sup>, Ataso<sup>MD</sup>,...) et d'anti-inflammatoire (p. ex : Motrin<sup>MD</sup>, Advil<sup>MD</sup>,...) en cas de fièvre.</li></ul>

### Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

<b>EFFETS INDÉSIRABLES</b>	<b>MESURES A PRENDRE</b>
<p>Des <b>réactions liées à la perfusion du rituximab</b> peuvent survenir principalement entre 30 minutes et 2 heures suivant le début de l'administration. Ces réactions se présentent généralement sous forme de fièvre et frissons mais des éruptions cutanées, démangeaisons, difficulté à respirer, nausées, maux de tête, étourdissements, bouffées de chaleur, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge peuvent aussi survenir. Ces symptômes, habituellement légers à modérés sont plus fréquents lors de la première perfusion et tendent à diminuer lors des perfusions subséquentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des médicaments pour prévenir les réactions vous seront prescrits avant le traitement.</li><li>• Avertissez immédiatement l'infirmière si l'un de ces symptômes se manifeste durant votre traitement. Des médicaments pourront alors vous être administrés.</li></ul>
<p>Rarement, une <b>douleur</b> ou des <b>crampes abdominales</b> peuvent se produire, surtout en début de traitement.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avertissez rapidement un membre de l'équipe et consultez un médecin.</li></ul>

### Considération spéciale liée à votre traitement

Si vous prenez des **médicaments pour diminuer votre pression**, vous ne devez pas les prendre au moins 12 heures avant de recevoir votre traitement. Avertissez votre pharmacien ou votre médecin, il vous indiquera comment les prendre.

Pharmacien : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

entre \_\_\_ h \_\_\_ et \_\_\_ h \_\_\_ (du lundi au vendredi)