Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Feuillet d'information destiné au patient Cétuximab

Rédaction: 26 octobre 2012

Révision : Avril 2016

Médicament	Horaire d'administration
Cétuximab	En perfusion intraveineuse en 1 heure*
	*La première dose est toujours administrée en 2 heures
<i>Répéter le traitement à toutes les semaines</i>	

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Généralités associées à votre traitement

- › Le cétuximab est utilisé pour empêcher la multiplication des cellules anormales et les détruire.
- › Une **prise de sang** sera faite avant chaque cycle de traitement. La dose du médicament pourra être ajustée ou encore le traitement pourra être retardé, si nécessaire, selon les effets indésirables survenus lors du traitement précédent.
- › De la **fatigue** peut survenir durant vos traitements. Ceci est habituellement temporaire et peut être relié à plusieurs facteurs (p. ex. : médication, stress, maladie). Gardez un bon niveau d'activité, mais reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin.
- › Une **diminution de l'appétit** peut survenir. Mangez plus souvent, mais en petites quantités à la fois.
- › Une **altération du goût** peut se manifester. Rehaussez le goût des aliments avec des fines herbes ou du jus de citron. Masquez le goût amer métallique à l'aide de fruits, de gomme à mâcher sans sucre, etc.
- › La consommation d'**alcool**, en petite quantité, est considérée sécuritaire et n'affectera pas l'efficacité du traitement.
- › Une **vie sexuelle** active n'est pas interdite durant vos traitements. Cependant, une diminution du désir peut survenir de façon temporaire durant cette période. Cela peut être influencé par plusieurs facteurs, dont la fatigue et le stress.
- › L'effet du cétuximab sur l'embryon n'est pas connu lorsqu'il est administré pendant la grossesse. La prise d'un moyen de **contraception** pendant le traitement est donc fortement recommandée. L'allaitement est contre-indiqué pendant toute la durée de votre traitement.
- › Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments, même ceux ne nécessitant pas de prescription, ou des produits naturels. Certains pourraient provoquer une interaction avec votre traitement et en diminuer l'efficacité ou en augmenter les effets indésirables.
- › Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et la disposition sécuritaires des liquides biologiques (p. ex. : urine, selles) pour protéger l'environnement et vos proches.
- › Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines, et autre produits de santé naturels et d'en remettre une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables et mesures à prendre

Effets indésirables	Mesures à prendre
Rarement, de légers maux de cœur peuvent survenir le jour même et le lendemain de votre traitement.	<ul style="list-style-type: none">• Au besoin, avant votre traitement, des médicaments pour prévenir les maux de cœur pourraient vous être prescrits. À la maison, vous pourriez aussi avoir des médicaments à prendre au besoin.• Communiquez avec un membre de l'équipe si vous avez des maux de cœur qui vous incommode.
Habituellement, aucune perte de cheveux ne se produit avec ce traitement.	
Des réactions cutanées peuvent apparaître 1 à 2 semaines après le début du traitement. Ces réactions peuvent se manifester de la façon suivante: <ul style="list-style-type: none">• Une éruption cutanée pourrait apparaître surtout au visage, au cou et sur la partie supérieure du corps. Ces réactions ressemblent à de l'acné et disparaissent habituellement quelques semaines après l'arrêt du traitement.• Votre peau pourrait devenir plus sèche et ceci pourrait être accompagné de démangeaison ou de rougeur.• Votre peau pourrait devenir aussi plus sensible au soleil.	<p>Pour aider à prévenir ou réduire l'apparition de ces réactions :</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisez des savons et des nettoyants doux non parfumés et sans alcool ainsi que des huiles de bain ou pour la douche afin d'éviter que la peau s'assèche.• Appliquez 2 fois par jour une crème épaisse et hydratante sur la peau (p. ex : lotion Aveeno^{MD}, la crème à mains Neutrogena^{MD}, ou la lotion Vaseline Soins intensifs^{MD}).• Utilisez des crèmes et des produits cosmétiques sans parfum, alcool ni colorant. Employez un fond de teint recommandé par les dermatologues pour cacher les éruptions.• Se démaquiller à l'aide d'un nettoyant doux.• Évitez l'exposition au soleil. Si vous devez vous exposer au soleil, portez un chapeau et des vêtements à manches longues.• Évitez les produits en vente libre contre l'acné qui peuvent assécher la peau.• Utilisez un écran solaire avec facteur de protection (FPS) égal ou supérieur à 30 jusqu'à 2 mois après l'arrêt de votre traitement. <p>Si, malgré ces mesures, des réactions cutanées apparaissent :</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultez un membre de l'équipe qui pourra vous conseiller des mesures appropriées.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
Des réactions reliées à la perfusion du cétuximab pourraient survenir pendant l'administration du médicament. Ces réactions se présentent généralement sous forme de fièvre et frissons mais des éruptions cutanées, démangeaisons, difficulté à respirer, maux de coeur, étourdissements, variations de la pression artérielle, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge peuvent aussi survenir. Ces symptômes, habituellement légers à modérés sont plus fréquents lors de la première perfusion et tendent à diminuer lors des perfusions subséquentes.	<ul style="list-style-type: none">• Des médicaments pour prévenir les réactions vous seront prescrits avant le traitement.• Avisez immédiatement l'infirmière si l'un de ces symptômes se manifeste durant votre traitement. Des médicaments pourront alors vous être administrés.
De la constipation peut survenir.	<ul style="list-style-type: none">• Buvez beaucoup de liquide (au moins 8 verres par jour, à moins d'avis contraire de votre médecin).• Communiquez avec un membre de l'équipe qui pourra vous conseiller des laxatifs appropriés si nécessaire.
De la diarrhée peut parfois survenir.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous de boire beaucoup de liquide (à moins d'avis contraire de votre médecin).• Si vous présentez une diarrhée (plus de 3 selles molles par jour) depuis plus de 24 heures, avisez un membre de l'équipe qui pourra vous conseiller des mesures appropriées.
Vous pourriez éprouver de l'essoufflement accompagné ou non de toux . Ces symptômes sont peu fréquents et peuvent être reliés à votre traitement.	<ul style="list-style-type: none">• Si ces symptômes apparaissent durant le traitement, parlez-en à un membre de l'équipe dès que possible.
Des maux de tête peuvent survenir.	<ul style="list-style-type: none">• Si cela vous incommode, vous pourriez prendre de l'acétaminophène ou un autre analgésique, s'il n'y a pas présence de fièvre.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
Des ulcères dans la bouche peuvent apparaître environ 3 à 10 jours après le début du traitement. Ces ulcères peuvent aussi apparaître au niveau de la gorge.	<ul style="list-style-type: none">• Brossez-vous les dents doucement et régulièrement après chaque repas et au coucher.• Utilisez un rince-bouche à base d'eau et de sel avec ou sans soda. Gargarisez-vous 4 fois par jour, après les repas et au coucher. Ne buvez pas et ne mangez pas dans l'heure qui suit votre gargarisme.• Les rince-bouches commerciaux sans alcool sont une bonne alternative.• Si des ulcères, de la sensibilité ou des rougeurs à l'intérieur de la bouche apparaissent, communiquez avec un membre de l'équipe sans délai.
Un changement de l'aspect de vos cils et de vos ongles pourrait survenir.	<ul style="list-style-type: none">• Si cette situation se produit, parlez-en à un membre de l'équipe lors de votre prochain traitement.
De la fièvre pourrait survenir durant votre traitement. Cette fièvre peut être une réaction au traitement plutôt qu'un signe d'infection.	<ul style="list-style-type: none">• Si ces symptômes vous incommodent, un analgésique tel l'acétaminophène (Tylenol®, Atasol®) peut être utilisé sur les recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien.• Si de la fièvre et des frissons surviennent plus de 24 heures après le traitement, il peut s'agir de signes d'infection, consultez alors immédiatement votre médecin ou présentez-vous à l'urgence.
Si vous notez une toux et/ou une fièvre persistante et des difficultés soudaines à respirer .	<ul style="list-style-type: none">• Communiquez immédiatement avec votre médecin ou présentez-vous à l'urgence.

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

entre ___ h ___ et ___ h ___ (du lundi au vendredi)