

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Feuillet d'information destiné au patient Protocole : Paclitaxel – Carboplatine

Rédaction : septembre 2003

Révision : novembre 2016

MÉDICAMENT / TRAITEMENT	HORAIRE D'ADMINISTRATION
Paclitaxel	Perfusion intraveineuse en 3 heures.
Carboplatine	Perfusion intraveineuse de 30 à 60 minutes, selon la dose.
<i>Répéter le traitement aux 3 semaines.</i>	

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Généralités associées à votre traitement

- ❑ Ces médicaments sont utilisés, en association, pour empêcher la multiplication des cellules anormales et les détruire.
- ❑ Une **prise de sang** sera faite avant chaque cycle de traitement. La dose du médicament pourra être ajustée ou le traitement retardé, si nécessaire, selon le résultat et/ou selon les effets indésirables survenus lors du traitement précédent.
- ❑ La consommation d'**alcool**, en petite quantité, est considérée sécuritaire et n'affectera pas l'efficacité du traitement.
- ❑ Une **altération du goût** peut se manifester. Rehaussez le goût des aliments avec des fines herbes ou du jus de citron. Masquez le goût amer métallique à l'aide de fruits, gomme à mâcher sans sucre, etc.
- ❑ Une **diminution de l'appétit** peut survenir. Mangez plus souvent, mais en petites quantités à la fois.
- ❑ **Chez la femme** non ménopausée, la chimiothérapie peut causer une irrégularité ou un arrêt du **cycle menstruel** pendant les traitements. Les menstruations peuvent se régulariser ou recommencer après l'arrêt des traitements. Elles peuvent également être cessées de façon permanente. Cependant, une grossesse est toujours possible et la prise d'un moyen de **contraception** pendant le traitement est donc fortement recommandée. Des effets nocifs au niveau de l'embryon pourraient survenir si le médicament est administré pendant la grossesse. L'allaitement est contre-indiqué pendant toute la durée de la chimiothérapie.
- ❑ Une **vie sexuelle** active n'est pas interdite durant vos traitements. Cependant, une diminution du désir peut survenir de façon temporaire durant cette période. Cela peut être influencé par plusieurs facteurs : fatigue, stress, etc.
- ❑ Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments (même ceux ne nécessitant pas de prescription) ou des produits naturels. Certains pourraient provoquer une interaction avec votre traitement et en diminuer l'efficacité ou en augmenter les effets indésirables.
- ❑ Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et la disposition sécuritaires des liquides biologiques (ex. : urine, selles) pour protéger l'environnement et vos proches.
- ❑ Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines et autres produits de santé naturels et, d'en remettre une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables et mesures à prendre

EFFETS INDÉSIRABLES	MESURES A PRENDRE
Des maux de cœur et des vomissements modérés peuvent survenir surtout le jour même et le lendemain de votre traitement.	<ul style="list-style-type: none">• Avant votre traitement, des médicaments pour prévenir les maux de cœur vous seront prescrits. À la maison, vous aurez à prendre des médicaments de façon régulière et, au besoin, pendant 1 à 2 journées ou plus, selon le cas après votre traitement.• Communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des maux de cœur ou des vomissements qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.
Une perte complète des cheveux et des poils se produira en général 2 à 3 semaines après le traitement. Cependant, rassurez-vous, les cheveux repousseront à la fin des traitements.	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez un shampoing doux.• Afin de ne pas accélérer la perte des cheveux, évitez de les brosser vigoureusement.
Une diminution des globules blancs débutera environ 1 semaine après le traitement et pourrait persister environ 10 jours. Vous pourriez être plus à risque de contracter des infections durant cette période.	<ul style="list-style-type: none">• Lavez-vous les mains souvent.• Durant cette période, évitez d'entrer en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses.• Signalez-nous rapidement tous signes d'infection (fièvre, frisson, toux, maux de gorge, douleur lorsque vous urinez,...).• Consultez votre médecin ou présentez-vous immédiatement à l'urgence si vous faites de la fièvre 38,3°C (101°F) une fois ou 38°C (100,4°F) 2 fois à une heure d'intervalle.• Éviter la prise d'acétaminophène (Tyléno[®], Atasol[®],...) et d'anti-inflammatoire (p. ex : Motrin[®], Advil[®], Aleve[®]..) en cas de fièvre.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

EFFETS INDÉSIRABLES	MESURES A PRENDRE
Une diminution des plaquettes peut survenir quelques semaines après le traitement. Vous pourriez saigner plus facilement qu'à l'habitude.	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez une brosse à dents à poils souples.• Vérifiez auprès de votre pharmacien avant de consommer des médicaments contenant de l'Aspirine®, de l'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires.• Consultez-nous si des ecchymoses (bleus) se manifestent de façon inhabituelle ou si vous avez tendance à saigner facilement du nez ou des gencives.
Une baisse des globules rouges peut survenir suite au traitement. Ce phénomène s'appelle anémie et est caractérisé par des signes de fatigue, pâleur, étourdissement et essoufflement.	<ul style="list-style-type: none">• Gardez un bon niveau d'activités, mais respectez les signes de fatigue de votre corps; reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin.• Si vous notez un ou plusieurs de ces effets, consultez-nous.
De la faiblesse aux jambes , des engourdissements ou des picotements aux mains ou aux pieds peuvent survenir. Ce phénomène augmente habituellement avec le nombre de traitements reçus.	<ul style="list-style-type: none">• Si cet effet survient et nuit à vos activités quotidiennes, parlez-en votre médecin ou votre pharmacien lors de votre prochain traitement.
Des réactions allergiques associées au paclitaxel peuvent parfois survenir. Ces réactions se manifestent habituellement par des éruptions cutanées, des rougeurs, de la démangeaison, de l'enflure ou de la difficulté à respirer pendant votre traitement.	<ul style="list-style-type: none">• Des médicaments pour prévenir les allergies vous seront prescrits avant le traitement.• Avertissez immédiatement l'infirmière si vous avez de la difficulté à respirer ou si vous avez de l'enflure au niveau de la langue ou de la gorge pendant votre traitement.
Des douleurs aux muscles et aux os peuvent survenir quelques jours après le traitement. Ces symptômes persistent habituellement 4 à 7 jours.	<ul style="list-style-type: none">• Si cela se produit, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien qui pourra alors vous conseiller un analgésique approprié.
De la douleur, de l'irritation, de l'enflure ou une sensation de brûlure au site d'injection peuvent survenir durant votre traitement.	<ul style="list-style-type: none">• Avertissez immédiatement votre infirmière si vous éprouvez ce malaise durant l'administration de votre traitement.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Considération spéciale liée à votre traitement

- ❑ Après votre traitement, il est recommandé de ne pas conduire votre véhicule ou d'effectuer des activités demandant de l'attention car vous pourriez ressentir de la somnolence ou des étourdissements.

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

entre ____ h ____ et ____ h ____ (du lundi au vendredi)