

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Feuillet d'information destiné au patient Bevacizumab

Rédaction : juillet 2008

Révision : octobre 2016

Médicament	Horaire d'administration
Bevacizumab	En perfusion intraveineuse au jour 1 de la chimiothérapie 1 ^{ère} perfusion : 90 minutes 2 ^{ième} perfusion : 60 minutes * 3 ^{ième} perfusion et plus: 30 minutes * * si traitement précédent bien toléré
Répéter le traitement aux ___ semaines (avec la chimiothérapie)	

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Généralités associées à votre traitement

- › Le bevacizumab est utilisé en association avec votre chimiothérapie pour traiter certains types de cancer. Il s'agit d'un anticorps monoclonal qui augmente l'efficacité de votre traitement de chimiothérapie.
- › Une **prise de sang**, un **test urinaire** ainsi que la **prise de votre pression artérielle** seront faits avant chaque cycle de traitement.
- › Des effets nocifs au niveau de l'embryon pourraient survenir si le médicament est administré pendant la grossesse. La prise d'un moyen de **contraception** pendant le traitement est donc fortement recommandée et ce jusqu'à 6 mois après votre dernier traitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant toute la durée de votre traitement.
- › Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments (même ceux ne nécessitant pas de prescription), des produits de santé naturels ou si vous devez recevoir un vaccin. Certains pourraient provoquer une interaction avec votre traitement et en diminuer l'efficacité ou en augmenter les effets indésirables.
- › Il est très important de nous aviser si vous débutez des médicaments tels que l'Aspirine®, des médicaments pour éclaircir le sang (p. ex. : Coumadin®,...) des anti-inflammatoires (p. ex.: Motrin®, Advil®,...).
- › Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et la disposition sécuritaires des liquides biologiques (p. ex. : urine, selles) pour protéger l'environnement et vos proches.
- › Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de tous vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines, et autres produits de santé naturels et d'en remettre une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables et mesures à prendre

Effets indésirables	Mesures à prendre
Le bevacizumab est administré en association avec une chimiothérapie. Nous vous invitons à consulter le feuillet d'information spécifique à votre chimiothérapie pour de l'information complémentaire au sujet de votre traitement	
Des saignements mineurs tels que des saignements de nez peuvent survenir.	› Asseyez-vous droit en penchant légèrement la tête vers l'avant. › Pincez vos narines et appliquez une pression continue pendant quelques minutes. Vérifiez si le saignement est arrêté. › Évitez de vous moucher pendant les 12 heures suivant le saignement. › Pour tout saignement qui persiste plus de 20 minutes, consultez immédiatement votre médecin ou présentez-vous à l'urgence.
De l'hypertension artérielle (augmentation de la tension) pourrait se développer.	› À chaque traitement, votre infirmière vérifiera votre tension artérielle. › En cas d'hypertension, des médicaments pourront vous être prescrits par votre médecin.
De la douleur abdominale peut survenir.	› Si cela se produit, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. › Présentez-vous sans délai à l'urgence si ces douleurs sont subites et intenses et accompagnées de maux de cœur, de vomissements ou de constipation.
Si vous présentez l'un des symptômes suivants : des maux de tête importants, des troubles de la vision, de la difficulté à parler, une perte de coordination, de la faiblesse ou des engourdissements, des douleurs ou serrement à la poitrine.	› Présentez-vous immédiatement à l'urgence.

Considération spéciale liée à votre traitement

Avisez votre dentiste ou médecin, si vous devez subir une chirurgie pendant que vous recevez le bevacizumab.

Pharmacien : _____ **Téléphone :** _____

Entre ____ h ____ et ____ h ____ (du lundi au vendredi)