

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Feuillet d'information destiné au patient TIP (paclitaxel-ifosfamide-cisplatine)

Rédaction : *avril 2019*

Révision :

Médicament	Horaire d'administration
Paclitaxel	Perfusion intraveineuse continue de 24 heures débutant le jour 1.
Ifosfamide	Perfusion intraveineuse de 2 heures, une fois par jour, les jours 2 à 6.
Mesna	Perfusion intraveineuse de 15 minutes juste avant l'ifosfamide puis : perfusion intraveineuse ou par la bouche 4 heures et 8 heures après le début de l'ifosfamide. Les jours 2 à 6.
Cisplatine	Perfusion intraveineuse d'une durée d'environ 1 heure, une fois par jour, les jours 2 à 6.
Filgrastim	En injection sous-cutanée une fois par jour pour 10 jours à partir du jour 7.
<i>Répéter le cycle aux 3 semaines pour un total de 4 cycles</i>	

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Généralités associées à votre traitement

- › Ces médicaments sont utilisés pour empêcher la multiplication des cellules anormales et les détruire.
- › Des **prises de sang** seront faites régulièrement durant les traitements. La dose des médicaments pourra être ajustée ou encore le traitement pourra être retardé, si nécessaire, selon le résultat de la prise de sang ou selon les effets indésirables survenus lors du traitement précédent.
- › De la **fatigue** peut survenir durant vos traitements. Ceci est habituellement temporaire et peut être relié à plusieurs facteurs (médication, stress, maladie...). Gardez un bon niveau d'activité mais reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin.
- › Une **diminution de l'appétit** peut survenir. Mangez plus souvent, mais en petites quantités à la fois.
- › Une **altération du goût** peut se manifester. Rehaussez le goût des aliments avec des fines herbes ou du jus de citron. Masquez le goût amer métallique à l'aide de fruits, de gomme à mâcher sans sucre, etc.
- › La consommation d'**alcool**, en petite quantité, est considérée sécuritaire et n'affectera pas l'efficacité du traitement.
- › Une **vie sexuelle** active n'est pas interdite durant vos traitements. Cependant, une diminution du désir peut survenir de façon temporaire durant cette période. Cela peut être influencé par plusieurs facteurs, dont la fatigue et le stress.
- › Le sperme peut être affecté et des effets nocifs sur l'embryon pourraient survenir. Par ailleurs, la production de spermatozoïdes peut être réduite ou complètement absente durant les traitements. Chez certains patients, cette baisse de fertilité peut être permanente, s'améliorer ou se normaliser à l'arrêt des traitements. Cette diminution de la **fécondité** n'entrave aucunement l'érection et l'activité sexuelle. Malgré cette baisse possible de fertilité, une grossesse est toujours possible. Si vous avez des relations avec une femme en âge de procréer, la prise d'un moyen de **contraception** pendant le traitement est donc fortement recommandée.
- › Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments (même ceux ne nécessitant pas de prescription), des **produits de santé naturels** ou si vous devez recevoir un **vaccin**. Certains pourraient provoquer une interaction avec votre traitement et en diminuer l'efficacité ou en augmenter les effets indésirables.
- › Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et la disposition sécuritaires des liquides biologiques (p. ex. : urine, selles,) pour protéger l'environnement et vos proches.
- › Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines, et autres produits de santé naturels et d'en remettre une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables et mesures à prendre

Effets indésirables	Mesures à prendre
Au jour 1, des maux de cœur habituellement légers peuvent survenir. Les jours 2 à 6, des maux de cœur et des vomissements sévères peuvent survenir et persister jusqu'à 5 jours après le dernier jour de traitement.	› Avant votre traitement, des médicaments pour prévenir les maux de cœur vous seront prescrits. Après votre traitement, vous aurez à prendre des médicaments de façon régulière et d'autres au besoin pendant au moins 3 jours. › Communiquez avec un membre de l'équipe si vous avez des maux de cœur ou des vomissements qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.
Une perte complète des cheveux et des poils se produira en général 2 à 3 semaines après le début du traitement. Cependant, rassurez-vous, les cheveux devraient repousser à la fin des traitements.	› Utilisez un shampoing doux.
Une diminution des globules blancs surviendra environ 1 à 2 semaines après le traitement. Vous pourriez être plus à risque de contracter des infections durant cette période.	› Lavez-vous les mains souvent. › Durant cette période, évitez d'entrer en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses. › Un médicament (filgrastim) vous sera prescrit pour stimuler votre système immunitaire (système qui vous protège contre les infections). › Signalez-nous rapidement tous signes d'infection (fièvre, frisson, toux, maux de gorge, douleur lorsque vous urinez, ...) › Consultez votre médecin ou présentez-vous immédiatement à l'urgence si vous faites de la fièvre 38,3°C (101°F) une fois ou 38°C (100,4°F) 2 fois à une heure d'intervalle. › Évitez la prise d'acétaminophène (p. ex : Tylenol®, Atasol®,...) et d'anti-inflammatoire (p. ex : Motrin®, Advil®, Aleve®..) en cas de fièvre.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
Une diminution des plaquettes surviendra environ 1 à 2 semaines après le traitement. Vous pourriez faire des bleus ou avoir tendance à saigner plus facilement qu'à l'habitude.	› Utilisez une brosse à dents à poils souples. › Vérifiez auprès de votre pharmacien avant de consommer des médicaments contenant de l'Aspirine®, de l'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires. › Communiquez avec un membre de l'équipe si des ecchymoses (bleus) se manifestent de façon inhabituelle ou si vous avez tendance à saigner facilement du nez ou des gencives.
Une baisse des globules rouges peut survenir suite au traitement. Ce phénomène s'appelle anémie et est caractérisé par des signes de fatigue, pâleur, étourdissement et essoufflement.	› Gardez un bon niveau d'activités mais respectez les signes de fatigue de votre corps; reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin. › Si vous notez un ou plusieurs de ces effets, communiquer avec un membre de l'équipe.
Des réactions allergiques associées au paclitaxel peuvent parfois survenir et se produisent généralement dans les 10 à 15 premières minutes suivant le début de la perfusion. Ces réactions se manifestent habituellement par des éruptions cutanées, des rougeurs, de la démangeaison, de l'enflure, de la difficulté à respirer et des douleurs à la poitrine, au ventre, au dos et au bassin. Ces réactions sont plus fréquentes au cours des premiers traitements.	› Des médicaments pour prévenir les allergies vous seront prescrits avant le traitement. › Avisez immédiatement l'infirmière si vous avez ces symptômes durant votre traitement.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
Le cisplatine peut affecter vos reins .	› Buvez beaucoup d'eau ou de liquide (10 à 12 verres de 230 ml ou 8 onces par jour) pendant 48 à 72 heures après le traitement (à moins d'avis contraire de votre médecin) et urinez fréquemment.
L'ifosfamide peut irriter votre vessie .	› Un test d'urine, pour détecter la présence de sang, sera fait avant chaque dose d'ifosfamide. › Un médicament, le mesna , vous sera prescrit afin d'éviter l'effet de l'ifosfamide sur votre vessie. › Le mesna peut être administré par les veines ou par la bouche. S'il est prescrit par la bouche, il peut être pris avec ou sans nourriture. Il est préférable de le mélanger avec du jus ou une boisson tel, du jus de raisin, de canneberge ou du cola (Coke®, Pepsi®,...). Une fois mélangé, il doit être pris immédiatement. Vous devez prendre la dose au complet. › <u>Si vous recevez ce traitement à la clinique externe</u> et que vous avez des vomissements dans les 2 heures après avoir pris votre dose de mesna, communiquez immédiatement avec un membre de l'équipe ou présentez-vous à l'urgence. › Avisez un membre de l'équipe si vous avez tendance à uriner moins souvent que d'habitude, si vous avez de la difficulté ou des douleurs lorsque vous urinez ou si vous notez du sang dans vos urines.
Des douleurs aux muscles et aux os peuvent survenir quelques jours après le traitement de paclitaxel. Ces symptômes persistent habituellement pendant 4 à 7 jours.	› Si cela se produit, parlez-en à un membre de l'équipe qui pourra alors vous conseiller un analgésique approprié.
De plus, des douleurs aux os peuvent survenir durant les injections de filgrastim.	

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
La cisplatine peut occasionner des sifflements ou bourdonnements d'oreilles et, plus rarement, une baisse de l'audition .	› Si vous notez ces symptômes, avisez un membre de l'équipe lors de votre prochaine visite.
De la faiblesse aux jambes , des engourdissements ou des picotements aux mains ou aux pieds peuvent survenir. Ce phénomène augmente habituellement avec le nombre de traitements reçus.	› Si ces effets surviennent, parlez-en à un membre de l'équipe lors de votre prochain traitement.
De la douleur , de l' irritation , de l' enflure ou une sensation de brûlure au site d'injection peuvent survenir durant la perfusion de paclitaxel.	› Avisez immédiatement votre infirmière si vous éprouvez ce malaise durant l'administration de votre traitement.
Effets indésirables rares pouvant être sévères ou sérieux à rapporter rapidement à votre médecin	
L'ifosfamide peut causer des vertiges , de la somnolence , un important mal de tête , des difficultés à parler , un manque de coordination des muscles , des mouvements involontaires des yeux , de la confusion , des hallucinations et des convulsions .	› Communiquez immédiatement avec un membre de l'équipe ou présentez-vous à l'urgence.

Considérations spéciales liées à votre traitement

- › Vous devez éviter de consommer du **pamplemousse**, de l'orange amère de Séville, de la carambole, du pomelo, de la grenade ou des aliments en contenant car ceci pourrait augmenter les effets indésirables de votre traitement.

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

Entre ____ h ____ et ____ h ____ (du lundi au vendredi)