

# Abémaciclib - Fulvestrant

Verzenio® - Faslodex®

L'abémaciclib est un traitement de **thérapie ciblée** contre le cancer en comprimés.  
Le fulvestrant est un traitement d'**hormonothérapie** contre le cancer en injection dans les muscles.

## Comprendre votre traitement

Qu'est-ce que la thérapie ciblée

Cette thérapie cible des molécules spécifiques situées à l'intérieur ou à la surface des cellules cancéreuses. En ciblant les cellules cancéreuses, ces médicaments limitent les dommages causés aux cellules en santé.

Qu'est-ce que l'hormonothérapie ?

L'hormonothérapie ralentit la croissance de certains cancers qui utilisent les hormones naturelles, comme l'œstrogène, la progestérone et la testostérone, pour se développer. L'hormonothérapie empêche les cellules cancéreuses d'utiliser ces hormones dont elles ont besoin pour se développer, ou empêche le corps de fabriquer l'hormone qui provoque la croissance du cancer.

Comment votre traitement peut-il vous aider ?

Selon votre type de cancer et son stade d'évolution, votre traitement peut être utilisé pour :

- **Détruire** les cellules cancéreuses
- **Arrêter** la propagation des cellules cancéreuses
- **Ralentir** la croissance des cellules cancéreuses

Comment allez-vous vous sentir ?

Ce n'est pas tout le monde qui ressent des effets indésirables et chaque personne réagit différemment. Les effets indésirables et leur gravité ne sont pas nécessairement un signe que le traitement fonctionne ou ne fonctionne pas.

Ce document contient les effets indésirables les plus souvent constatés avec votre traitement.

Médicament

**Abémaciclib**

Comprimés à avaler

**Fulvestrant**

Injections dans les muscles

Horaire d'administration

Prendre 2 fois par jour avec ou sans nourriture

**Prendre en continu**

Aux jours 1, 14 et 28 (pour le premier mois) puis aux 28 jours



- Des **prises de sang** seront faites régulièrement durant votre traitement. Selon le résultat des prises de sang ou selon les effets indésirables survenus, la dose d'abémaciclib pourra être ajustée ou le traitement pourra être retardé si nécessaire.
- Des examens pourront être effectués afin de vérifier l'état de vos **os**. Le fulvestrant pourrait augmenter le risque d'ostéoporose et de fractures. Il se peut que de la vitamine D et du calcium vous soient prescrits afin de maintenir la qualité de vos os durant votre traitement. Il est important que vous consommiez des aliments riches en calcium (yogourt, fromage, laits, etc.).

## Comment prendre vos médicaments ?

### Pour l'abémaciclib :

- Prenez vos comprimés d'abémaciclib tel que prescrits 2 fois par jour, à la même heure à chaque jour, avec ou sans nourriture. Si vous avez de la difficulté à les tolérer, comme par exemple, mal à l'estomac, prenez-les en mangeant. Vous devez prendre vos comprimés en continu.
- Les comprimés doivent être avalés entiers. Ne pas croquer, couper ou écraser les comprimés.
- **Si vous oubliez une dose d'abémaciclib**, vous ne devez pas prendre de dose supplémentaire. Vous devez simplement prendre la dose suivante selon l'horaire habituel. Cependant, essayez de prendre vos comprimés le plus régulièrement possible, à la même heure à chaque jour et de la même façon (c'est-à-dire avec ou sans nourriture).

### Pour le fulvestrant :

- Ce médicament est habituellement administré par un professionnel de la santé dans le muscle de la fesse.

## Comment manipuler et conserver vos médicaments ?



- Lavez vos mains immédiatement après avoir manipulé vos comprimés.
- Conservez vos médicaments loin de la portée des enfants et des animaux.
- Gardez les comprimés d'abémaciclib à la température de la pièce, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Évitez de les conserver dans la salle de bain.
- Gardez vos seringues de fulvestrant dans leur emballage original, au réfrigérateur, à l'abri de la lumière.
- Ne jetez pas à la maison les médicaments non utilisés. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger. Vous pouvez jeter les contenants vides dans une poubelle.
- Pour l'abémaciclib, si le médicament touche la surface d'un meuble par mégarde, lavez et frottez-le avec de l'eau et du savon.
- La personne qui vous aide doit utiliser des gants jetables pour toucher aux médicaments. Vous trouverez des gants jetables à votre pharmacie.
- Gardez les médicaments dans leur contenant d'origine. Ne les mélangez pas avec d'autres médicaments. Le contenant ne doit jamais être réutilisé pour mettre d'autres objets ou de la nourriture.

## Comment ce traitement peut-il affecter la vie de tous les jours ?

### Fatigue et appétit



- De la **fatigue** peut survenir durant vos traitements. Ceci est habituellement temporaire et peut être relié à plusieurs facteurs (médication, stress, maladie). Gardez un bon niveau d'activité mais reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin.
- Une **diminution de l'appétit** peut survenir. Mangez plus souvent mais en petites quantités à la fois.
- Une **altération du goût** peut se manifester. Rehaussez le goût des aliments avec des fines herbes ou du jus de citron. Masquez le goût amer métallique à l'aide de fruits, gomme à mâcher ou bonbons sans sucre, etc.
- La consommation d'**alcool** (en petite quantité) est **considérée sécuritaire** et n'affectera pas l'efficacité du traitement.

### Vie sexuelle et contraception



- Une **vie sexuelle** active n'est pas interdite durant vos traitements. Cependant, une diminution du désir peut survenir de façon temporaire durant cette période. Cela peut être influencé par plusieurs facteurs (fatigue, stress, etc.).
- Il est sécuritaire de s'embrasser, de se toucher, de se tenir la main, de dormir dans le même lit et de se coller.
- **Chez la femme**, un moyen de contraception est habituellement non nécessaire compte tenu que ce traitement est habituellement administré chez des femmes ménopausées. Cependant, la prise de ce médicament peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse.

### Aliments et médicaments à éviter



- **Pamplemousse**  
Évitez de consommer du pamplemousse, de l'orange amère de Séville, de la carambole, du pomelo, de la grenade ou des aliments en contenant, car ceci pourrait augmenter les effets indésirables de l'abémaciclib.



- Le fulvestrant diminue le taux d'**œstrogènes** dans votre sang. Évitez de prendre des produits à base d'hormones pour traiter les symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, etc.). Certains produits naturels peuvent aussi contenir des ingrédients qui agissent comme des hormones même s'ils n'en contiennent pas. Parlez de ces produits à votre pharmacien qui pourra vérifier si vous pouvez les consommer.

### Conseils et précautions



- **Uriner assis et fermer le couvercle**  
Pour éviter les éclaboussures, urinez assis et fermez le couvercle de la toilette avant d'actionner la chasse d'eau. Activez la chasse d'eau 2 fois pour bien vous débarrasser des résidus durant la durée de vos traitements (ou selon les directives de votre centre de cancérologie).

- **Liquides biologiques**

Pendant la durée de votre traitement, on peut retrouver de votre médicament dans certains liquides ou sécrétions que vous produisez tels que dans l'urine, les selles, les vomissements, les sécrétions vaginales. Pour protéger vos proches et l'environnement, suivez les directives de votre centre de cancérologie concernant la manipulation et l'élimination sécuritaires des liquides biologiques.



- **Médicaments sans prescription, produits de santé naturels et vaccins**

Consultez votre équipe traitante :

- si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments (prescrits ou sans prescription), des produits de santé naturels.
- si vous devez recevoir un vaccin.

Cela pourrait diminuer l'efficacité de votre traitement ou en augmenter les effets indésirables.

- **Avoir toujours la liste complète de vos médicaments**

Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines, et autres produits de santé naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.



## Quels sont les effets indésirables associés à votre traitement ?

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

### EFFETS INDÉSIRABLES

### MESURES À PRENDRE

#### Diarrhée

De la diarrhée (selles molles et liquides) peut survenir et débuter environ 7 jours après le début du traitement.

- Assurez-vous de boire beaucoup de liquide (8 à 10 verres par jour) à moins d'avis contraire de votre médecin.
- Mangez et buvez souvent mais en petites quantités.
- ✔ **Continuez le traitement si** : vos selles sont plus molles que d'habitude ou que vous avez 2 à 3 selles de plus par jour. Prenez 2 comprimés de lopéramide (Imodium®) au départ, puis 1 comprimé après chaque selle liquide (maximum de 8 comprimés par période de 24 heures). Avisez votre équipe traitante si la diarrhée ne s'améliore pas dans les 24 heures suivant la prise du lopéramide.
- ⚠ **Continuez le traitement et téléphonez à l'équipe traitante dès que possible si** : vous avez 4 à 6 selles de plus par jour. Prenez 2 comprimés de lopéramide (Imodium®) au départ, puis 1 comprimé après chaque selle liquide (maximum de 8 comprimés par période de 24 heures).
- ⊖ **Cessez l'abémaciclib et téléphonez à l'équipe traitante dans les plus brefs délais, ou rendez-vous à l'urgence si** : vous avez au moins 7 selles de plus par jour ou vous n'êtes pas capable de vous retenir (incontinence). Vous avez une diarrhée avec de la fièvre.

#### Diminution des globules blancs

Une diminution des globules blancs surviendra pendant le traitement. Vous pourriez être plus à risque de contracter des infections durant cette période.

- Lavez-vous les mains souvent.
- Durant cette période, évitez d'entrer en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses.
- Communiquez rapidement avec un membre de l'équipe si vous présentez d'autres signes d'infection (frisson, toux, maux de gorge, douleur lorsque vous urinez, etc.).
- Ne prenez pas d'acétaminophène (p.ex. : Tylenol®, Atasol®, etc.) et d'anti-inflammatoire (p. ex. : Motrin®, Advil®, Aleve® etc.) en cas de fièvre.
- ⊖ **Cessez l'abémaciclib et rendez-vous à l'urgence si** :
  - vous faites de la fièvre à 38,3°C (101°F) ou plus
  - ou
  - vous faites de la fièvre à 38°C (100,4°F) 2 fois à une heure d'intervalle.

**Maux de cœur**

Des maux de cœur et des vomissements habituellement légers à modérés peuvent survenir durant la prise de l'abémaciclib.

- Des médicaments à prendre au besoin vous seront prescrits si des maux de cœur surviennent.
- ✔ **Continuez le traitement si** : vous avez des maux de cœur légers qui ne vous empêchent pas de manger. Assurez-vous de prendre vos médicaments contre les maux de cœur.
- ⚠ **Continuez le traitement et téléphonez à l'équipe traitante dès que possible si** : vous avez des maux de cœur modérés, ou présence de vomissements qui vous empêchent de manger, mais pas complètement. Assurez-vous de continuer vos médicaments contre les maux de cœur.
- ➖ **Cessez l'abémaciclib et téléphonez à l'équipe traitante dans les plus brefs délais ou rendez-vous à l'urgence si** : vous avez des maux de cœur sévères ou des vomissements répétés qui vous empêchent complètement de manger.

**Douleur abdominale**

De la douleur abdominale peut survenir.

- Si cela se produit, parlez-en à un membre de l'équipe qui pourra alors vous conseiller sur les mesures à prendre.

**Maux de tête**

Des maux de tête peuvent parfois survenir.

- Si cela se produit, parlez-en à un membre de l'équipe qui pourra alors vous conseiller un médicament contre la douleur.

**Perte de cheveux**

Selon les personnes, un éclaircissement des cheveux plus ou moins important peut se produire. Cependant, rassurez-vous, les cheveux repousseront à la fin des traitements.

- Utilisez un shampoing doux.
- Afin de ne pas accélérer la perte des cheveux, évitez de les brosser vigoureusement.
- Évitez les fixatifs, teintures et permanentes.

**Bouffées de chaleur**

Des bouffées de chaleur peuvent se produire. Ces effets sont variables et peuvent s'atténuer avec le temps.

- N'oubliez pas de consulter votre pharmacien avant de prendre des produits naturels. Certains pourraient nuire à l'efficacité de votre traitement.
- Si ces symptômes persistent ou vous incommode, parlez-en à votre équipe qui pourra vous conseiller d'autres mesures à prendre.

**Sécheresse vaginale**

Des démangeaisons et une sécheresse vaginale sont possibles.

- Si ceci vous incommode, parlez-en à un membre de votre équipe de soins qui pourra vous suggérer certaines crèmes.

## EFFETS INDÉSIRABLES

## MESURES À PRENDRE

### Réactions au site d'injection

De la rougeur, de la douleur, de la sensibilité, de l'enflure ou une réaction au site d'injection peuvent survenir durant vos traitements.

- Appliquez des compresses tièdes de 15 à 20 minutes plusieurs fois par jour sur le site d'injection.
- Si vous notez un ou plusieurs de ces effets et qu'ils persistent malgré l'application de compresses, communiquez avec un membre de l'équipe.

## EFFETS INDÉSIRABLES RARES POUVANT ÊTRE SÉVÈRES OU SÉRIEUX

**Si les effets indésirables suivants se produisent, cessez le traitement et avisez immédiatement un membre de l'équipe ou présentez-vous immédiatement à l'urgence :**

- Sensibilité et ou de l'enflure aux chevilles ou aux mollets
- Douleur à la poitrine
- Difficulté soudaine à respirer

PHARMACIEN : \_\_\_\_\_

TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_

ENTRE \_\_\_ H \_\_\_ ET \_\_\_ H \_\_\_ (DU LUNDI AU VENDREDI)

Ce feuillet d'information a été préparé par un sous-comité du Comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques du Programme québécois de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux, en concertation avec le Comité de l'évolution de la pratique en oncologie de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

RÉDACTION NOVEMBRE 2019



# Journal de bord | Abémaciclib + Fulvestrant 28 jours

DATE DÉBUT CYCLE :

## LÉGENDE

-  Continuez le traitement.
-  Continuez le traitement et téléphonez à l'équipe traitante dès que possible.
-  Cessez l'**abémaciclib** et téléphonez à l'équipe traitante dans les plus brefs délais ou présentez-vous à l'urgence.

Référez-vous au feuillet d'information pour plus de détails.

		JOURS DU CYCLE																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
(Inscrivez la dose prise)	Abémaciclib : <b>mg</b>																													
	Fulvestrant : (*le 1 <sup>er</sup> mois seulement)														*															*
Date de prise (jj-mm)																														
<b>DIARRHÉE</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	Diarrhée légère : vous avez 2 à 3 selles de plus par jour que d'habitude.																													
	Diarrhée modérée : vous avez 4 à 6 selles de plus par jour que d'habitude.																													
	Diarrhée sévère : vous avez au moins 7 selles de plus par jour que d'habitude, ou vous n'êtes pas capable de vous retenir (incontinence).																													
<b>DIMINUTION DES GLOBULES BLANCS</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	Votre température est plus haute que 38,3°C (101°F) ou vous avez fait 38°C (100,4°F) deux fois à 1 heure d'intervalle avec ou sans symptômes d'infection.																													

<b>MAUX DE CŒUR ET VOMISSEMENTS</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
 Maux de cœur légers qui ne vous empêchent pas de manger.																												
 Maux de cœur modérés, ou présence de vomissements qui vous empêchent de manger, mais pas complètement.																												
 Maux de cœur sévères ou des vomissements répétés qui vous empêchent complètement de manger.																												